

【 レモンボトル使用方法・注意事項】 1/4 ページ

レモンボトルアンプルソリューションは、天然成分だけで構成された次世代の溶解剤です。

主な成分はタンパク質の分解酵素であるプロメラインと、脂肪分解効果のあるレシチンです。

痛みや腫れが出にくいことや、施術後に別の施術を組み合わせられることが特徴です。

効果は個人差が大きく、特に排出によって左右されます。

脂肪溶解剤のみでは、最大の効果が出にくい場合がございますので、代謝アップや重金属の排出など、複合的に行うことをお勧めいたします。

1 回で効果がみられる箇所から、6～12 回程度必要な場合がございますので、患者様の脂肪の状態を見ながらご判断ください。

<サロン>

1. 施術後、お早めに 400cc 以上のお水の摂取をお勧めしております。

2. 施術当日の夕方から翌朝まで絶食をすることによって、体内の未使用の脂肪を分解、排出しやすくします。

3. 溶解剤が広範囲に広がる可能性があるため、実施個所はカウンセリングをしっかりと行った上でご判断ください。

4. 次回の施術は、7 日後程度を推奨しております。

5. 薬剤は広範囲に広がります。1 箇所につき 1～3cc 程度を推奨しております。

【 レモンボトル使用方法・注意事項】 2/4 ページ

■顔

顔は内臓脂肪がないために効果が出やすいです。一度脂肪細胞を減らしてしまうと脂肪がつきづらく、肌も強みやすいため、 少量ずつの使用をお勧めします。

上頬…適量： 1 ～ 2 cc/ 1 回

ジョールファット…適量： 1 cc/ 1 回

フェイスライン…適量： 1 ～ 2 cc/ 1 回

あご下…適量： 1 ～ 2 cc/ 1 回

■ブラファット・二の腕

ブラファットは顔と同様、一度脂肪細胞を減らしてしまうと脂肪がつきづらいため、少量ずつの使用をお勧めします。二の腕での効果は個人差が大きく、また痛みや内出血を伴うことが多いです。

脂肪の量も多いため、中長期的な施術をお勧めいたします。

ブラファット（片側） …適量： 1 ～ 2 cc/ 1 回

二の腕（片側） …適量： 5 ～ 20cc/ 1 回

■お腹

お腹は内臓脂肪があるため、 内臓脂肪の量が多い方 は見た目の変化がわかりづらいです。一度にある程度の量が必要になります。 体の重金属含有量によっても脂肪排出の効果に大きな差が出ますので、代謝 アップや重金属排出など、 他の施術との組み合わせをお勧めいたします。

お腹…適量： 5 ～ 30cc/ 1 回

【レモンボトル使用方法・注意事項】 3/4 ページ

■膝上

膝上は施術を定期的におこなうことで効果が出やすい箇所になります。

膝上…適量：1～3cc/1回

■腰

腰はお腹に比べて変化が出やすい箇所になります。内出血が出やすい方もいますので初回は少量

でおこない、様子を見てから最適な量を判断してください。

腰…適量：5～10cc/1回

■太もも・ふくらはぎ

太ももやふくらはぎは筋肉と脂肪の区別がつきにくいいため、慎重に施術を行ってください。痛み

や内出血を伴うことが多いため、事前の指導が必要です。

もも裏…適量：5～20cc/1回

内もも…適量：5～20cc/1回

■保存方法

- ・使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください
- ・極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

【レモンボトル使用方法・注意事項】 4/4 ページ

■禁忌および注意事項

- ・授乳中の患者様(授乳を終えてから 6 週間後)
- ・18 歳未満のお子様
- ・乳房縮小を目的としている患者様
- ・細小血管障害や血管不全のある患者様
- ・免疫不全または自己免疫疾患(特に強皮症)を持つ患者様
- ・抗がん剤治療を行っている患者様
- ・治療箇所の周辺に皮膚に潰瘍や感染のある患者様
- ・現在湿疹または乾癬を発症している患者様
- ・過度に効果を期待する患者様

■リスク

大量の細胞分解により、電解質起因による体調不良や、腎機能や肝機能への負担が想定されます。皮膚からの導入の場合、パイナップルアレルギー 小麦アレルギーによる接触性アレルギー症状を引き起こす可能性がございますので、事前に患者様へご確認ください。

■施術未推奨ケース

- ・授乳中 糖尿病・心疾患・腎疾患・高血圧・甲状腺機能亢進症(バセドウ病)の方など